



DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ - 4

1. $a < b < 0 < c$ olmak üzere

$$\frac{x^2 + (a+b)x + ab}{x+c} \leq 0 \text{ eşitsizliğinin çözüm kümesi}$$

aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-c, -b]$
B) $(-a, \infty)$
C) $(-c, -b)$
D) $(-\infty, -c) \cup [-b, -a]$
E) $(-\infty, -c) \cup [-a, -b]$

2. $\frac{(-x^2 + x - 1)(x - 1)^3}{|x + 4|(x^2 + x - 2)} \geq 0$ eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri kaçtır?

- A) -7 B) -5 C) -3 D) 1 E) 2

3. $(x + 1)(x^2 - x - 6) < 0$ olduğuna göre x 'in alabileceği doğal sayı değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

4. $(m - 1)x^2 - 2(m + 1)x - 1 < 0$ eşitsizliği $\forall x \in \mathbb{R}$ için sağlanıyorsa m 'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-3, 0)$ B) $(0, 1)$ C) $[1, \infty)$
D) $(-3, 1] - \{0\}$ E) $\mathbb{R} - [0, 1)$

5. $x^2 - (m + 2)x + 4 = 0$ denkleminin gerçekte kökü olmadığına göre m hangi aralıktadır?

- A) $[2, \infty)$ B) $(-6, 2)$ C) $(-6, \infty)$
D) $(-6, -2)$ E) $[6, 2]$

6. $(a - 3)x^2 + 23(a + 1)x - 6(a - 2) = 0$ denkleminin gerçekte kökleri x_1 ve x_2 arasında $x_1 < 0 < x_2$ ve $|x_1| > x_2$ bağıntıları olduğuna göre a hangi aralıkta olmalıdır?

- A) $(-1, 2)$
B) $(-\infty, -1)$
C) $(-1, 3)$
D) $(2, 3) \cup (3, \infty)$
E) $(-\infty, -1) \cup (3, \infty)$

DENKLEM VE EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ - 4

7. $(a^2 - a - 12)x^2 + (a^4 - 1)x + a - 2 = 0$ denkleminin zıt işaretli iki kökü olduğuna göre a 'nın alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. $(m - 3)x^2 + 2x + m + 1 = 0$ denkleminin kökleri x_1 ve x_2 'dir.

Denklemin kökleri arasında $x_1 < 0 < x_2$ ve $|x_1| < |x_2|$ bağıntıları olduğuna göre m 'nin değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) (1,4) B) (1,3) C) $(-\infty, 3)$
D) $(-1, \infty)$ E) $(-1, 3)$

9. $\frac{x+1}{x} - \frac{x+1}{x-1} \geq 1$
 $\frac{1}{x+1} + \frac{6}{x+5} \geq 1$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $[0,1]$ B) $(0,1)$ C) $(-5,-2)$
D) $R - (0,1)$ E) $(2,5)$

10. $x^2 \leq 4x$

$$\frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{x-2}$$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesindeki doğal sayıların toplamı kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. $-4 < x^2 + 5x < 6$ eşitsizliğini sağlayan kaç farklı tam sayı vardır?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

12. $x^2 - 8x + 15 \geq 0$

$$\frac{x+3}{x-5} \leq 0$$

eşitsizlik sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(-3,5]$ B) $(-3,4]$ C) $[-3,3]$
D) $(0,5)$ E) $[-3,0]$

MEB 2016 - 2017